

核准日期：2015年12月04日
修改日期：2020年10月10日
修改日期：2024年12月06日

瑞香素胶囊说明书


Daphnetin Capsules

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

1. 手术后有出血倾向患者禁用。2. 肝肾功能不全患者禁用。
3. 严重高血压患者禁用。4. 孕妇及哺乳期妇女禁用。5. 对本品过敏者禁用。

【药品名称】通用名称：瑞香素胶囊
英文名称：Daphnetin Capsules
汉语拼音：Ruixiangsu Jiaonang

【成份】本品主要成份为瑞香素，化学名称：7,8-二羟基香豆素。化学结构式：



分子式： $C_9H_6O_3$
分子量：178.14

【性状】本品为硬胶囊剂，内容物为类白色或灰白色粉末；无臭，无味。
【适应症】用于血栓闭塞性脉管炎及其他闭塞性血管疾病和冠心病的辅助治疗。
【规格】0.15g
【用法用量】口服。一次0.45g，一日3次。
【不良反应】偶有口干，手热感。
【禁忌】1. 手术后有出血倾向患者禁用。2. 肝肾功能不全患者禁用。3. 严重高血压患者禁用。4. 孕妇及哺乳期妇女禁用。5. 对本品过敏者禁用。
【注意事项】尚不明确。
【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇及哺乳期妇女禁用。
【儿童用药】本品未进行该项实验且无可靠参考文献。
【老年用药】本品未进行该项实验且无可靠参考文献。
【药物相互作用】维生素K对本品有拮抗作用。
【药物过量】本品未进行该项实验且无可靠参考文献。
【药理毒理】1、药理 瑞香素具有扩张冠状血管，增加冠脉血流量，减少心肌耗氧量，改善心肌代谢促进心功能恢复，扩张末梢血管以及抗动脉血栓形成和抑制血小板凝集作用；并有兴奋垂体-肾上腺皮质系统的抗炎作用。
2、毒理 小鼠灌胃的LD₅₀为5.37g/kg，亚急性毒性实验表明瑞香素对实验动物的心、肝、脾、肺、肾均无明显毒性。
【药代动力学】瑞香素吸收后在体内分布较广，其中以肾最高，其次为肺、脾、血浆，主要排泄途径为肾。
【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。
【包装】药用PVC硬片，药品包装用铝箔，12粒×3板/盒。
【有效期】暂定24个月
【执行标准】国家药品标准WS-10001- (HD-1123) -2002
【批准文号】国药准字H22024043
【药品上市许可持有人/生产企业】吉林省西点药业科技发展股份有限公司
【注册地址/生产地址】吉林省磐石经济开发区西点大街777号
【邮政编码】132300
【电话号码】0432-65888277
【传真号码】0432-65888299